




MOVENTO®

Návod na použitie

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka na ha	Ochranná doba
Jabloň	Vlnačka krvavá, voška jablonoňová, voška skorocelová, štítnička nebezpečná	0,75 l/1m výšky koruny	21 dní
Hruška	Méra hrušková, vošky	0,75 l/1m výšky koruny	21 dní
Marhúľa	Vošky	0,5 l/1m výšky koruny	21 dní
Čerešňa, višňa	Vošky	0,5 l/1m výšky koruny	14 dní
Broskyňa, slivka	Vošky	0,5 l/1m výšky koruny	21 dní
Chmeľ	Voška chmeľová, roztočec chmeľový	1,5 l	21 dní
Vinič	Fyloxéra viničová	0,75 l	14 dní
Okrasné rastliny	Vošky	0,75 l	AT
Ovocné a okrasné škôlky	Vošky	0,15–0,6 l	AT
Šalát	Vošky	0,75 l	7 dní
Brokolica, karfiol	Vošky	0,75 l	3 dni
Kel, kel ružičkový, kel kučeravý	Vošky	0,75 l	3 dni
Kapusta hlávková červená, biela	Vošky	0,75 l	3 dni
Kapusta čínska, kaleráb	Vošky	0,75 l	3 dni
Špenát	Vošky	0,75 l	7 dní
Cibuľoviny	Vošky	0,75 l/ha	AT
Jahody	Vošky, roztočik jahodový	0,75 l/ha	AT
Zemiaky	Vošky	0,72 l/ha	14

Technicko-poradenský servis



- Ing. Ľuboš Žilincík, PhD. Mobil: 0908 710 749
- Ing. Gašpar Józán Mobil: 0905 421 922
- Ing. Miloš Polcer Mobil: 0903 288 160
- Ing. Karol Máté Mobil: 0905 646 311
- Ing. Juraj Dobrovodský Mobil: 0903 288 841
- Ing. Jozef Vanyo Mobil: 0918 603 384

Bayer spol. s r.o.
Twin City, blok A, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
tel.: 02 592 139 50, fax: 02 592 13 111

Vydané 12/2018

cropscience.bayer.sk



Dvojaký spôsob účinku pred ktorým niet úniku



MOVENTO®



Science for a better life

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Rešpektujte varovné vety a symboly.



MOVENTO®

Spirotetramat

Spirotetramat sa mechanizmom účinku radí medzi inhibítory biosyntézy lipidov (LBI, skupina 23), patrí medzi deriváty kyseliny tetrónovej. Pôsobí najmä na mladé vývojové štádiá cicavého hmyzu.

U nýmľ po aplikácii neprebehne ďalšie zvliekanie, stanú sa imobilnými a následne hynú. Dospelí jedinci plodia nevyvinuté nymfy, prípadne ak sú živé hynú najneskôr do 24 hodín. Dospelí jedinci uhynú za 4–7 dní po aplikácii a tým, že majú zreteľne zníženú plodnosť, je silno devastovaná celá populácia čo je dôvodom dlhodobého reziduálneho pôsobenia proti voškám a roztočom.



2-systémový účinok


Štandardné komerčné systémové insekticídy sú v rastline rozvádzané iba pomocou xylému akropetálne (one-way systemic). Účinná látka prípravku **Movento® 100 SC** je akropetálne a bazipetálne transportovaná floémom rastlín, po aplikácii na listy je tak rovnomerne rozvedená do všetkých rastlinných častí vrátane nových výhonkov, listov a koreňov (two-way systemic).

Vďaka tomuto efektu poskytuje **Movento® 100 SC** vysoko spoľahlivú ochranu aj proti tým najskrytejším žijúcim škodcom na akejkolvek časti rastliny.

2XSYS

Transport pomocou xylému

one-way systemic
- štandardné systémové insekticídy



Transport pomocou floému


two-way systemic
- **Movento® 100 SC**




Movento® 100 SC

Hlavné prednosti


- nová insekticídna účinná látka zo skupiny „keto-enolov“
- špecifický mechanizmus účinku
- unikátny spôsob ochrany rastlín pred cicavým hmyzom
- dlhotrvajúca systémová účinnosť
- široká registrácia v ovocných drevinách, zelenine, chmeli a viniči
- nástroj antirezistentnej stratégie



Účinnosť proti voške skorocelovej na jabloniach



Účinnosť proti mére hruškovej na larvy 3.–4. instaru



Movento® 100 SC
0,75 l/1 m výšky koruny



cropsience.bayer.sk